

Art	Herkunft	Blüte	Kletterform	Kletterhilfe	Höhe ↑	Breite ↔	Wurzelsystem	Lichtbedarf	Boden pH	Bodenfeuchte	Nährstoffgehalt Boden	Sommergrün SG Immergrün IG	Giftig	Ökologie
<i>Actinidia arguta</i> – Scharfzähniger Strahlengriffel	Asien	IV	Schlinger	ja	3 - 4 m ↑	4 - 8 m ↔	Herzwurzler		sauer	☾☾☾	+++	SG		
<i>Actinidia deliciosa</i> – Kiwi	Asien	VI-VII	Schlinger	ja	5 - 10 m ↑	4 - 7 m ↔	Herzwurzler		säuerlich	☾☾	+++	SG		
<i>Actinidia kolomikta</i> – Rosa Strahlengriffel	Asien	V-VI	Schlinger	ja	3 - 6 m ↑	2 - 4 m ↔	Herzwurzler		neutral	☾	-/+	SG		
<i>Actinidia polygama</i> – Japanischer Strahlengriffel	Asien	V-VII	Schlinger	ja	5 – 6 m ↑	5 – 6 m ↔	Flachwurzler		säuerlich	☾☾	-/+	SG		
<i>Clematis vitalba</i> – Gewöhnliche Waldrebe	einheimisch	VII-X	Blattstielranker	ja	5 - 10 m ↑	3 - 8 m ↔	Flachwurzler		sauer	☾	+++	SG		
<i>Clematis alpina</i> – Apfen-Waldrebe	Europa, Gebirge	IV-VI	Blattstielranker	ja	1 - 3 m ↑	1 - 2 m ↔	Flachwurzler		neutral	☾☾	--	SG		
<i>Clematis armandii</i> – Armands Waldrebe	Asien	III-V	Blattstielranker	ja	3 - 5 m ↑	3 - 5 m ↔	Flachwurzler		neutral	☾☾	-/+	IG		
<i>Clematis flammula</i> – Brennende Waldrebe	Mittelmeerraum	VII-IX	Blattstielranker	ja	2 - 4 m ↑	1 - 2 m ↔	Flachwurzler		neutral	☾☾	+++	SG		
<i>Clematis montana</i> – Berg-Waldrebe	Asien	V-VII	Blattstielranker	ja	5 - 12 m ↑	1 - 2 m ↔	Flachwurzler		neutral	☾☾	+++	SG		
<i>Clematis orientalis</i> – Orientalische Waldrebe	Asien	IX-X	Blattstielranker	ja	3 - 6 m ↑	1 - 2 m ↔	Flachwurzler		neutral	☾☾	+++	SG		
<i>Clematis paniculata</i> – Herbst-Waldrebe	Asien	VIII-X	Blattstielranker	ja	5 - 10 m ↑	1 - 2 m ↔	Flachwurzler		neutral	☾☾	+++	SG		
<i>Clematis viticella</i> – Italienische Waldrebe	Mittelmeerraum	VI-X	Blattstielranker	ja	2 - 3 m ↑	0,5 - 1 m ↔	Flachwurzler		neutral	☾☾	+++	SG		
<i>Hedera helix</i> – Efeu	einheimisch	IX-XI 10 Jahre	Haftwurzeln	nein	4 - 20 m ↑	4 - 20 m ↔	Herzwurzler		sauer	☾	+++	IG		
<i>Humulus lupulus</i> – Hopfen	einheimisch	XII-XIII	Schlinger	ja	3 - 10 m ↑	2 - 4 m ↔	Flachwurzler		neutral	☾☾☾	-/+	SG		
<i>Hydrangea petiolaris</i> – Kletter-Hortensie	Asien	VI-VII	Haftwurzeln	Ja/ nein	6 - 10 m ↑	2 - 4 m ↔	Flachwurzler		sauer	☾☾	+++	SG		
<i>Lonicera periclymenum</i> – Waldgeißblatt	einheimisch	V-VI	Schlinger	ja	3 - 6 m ↑	1 - 3 m ↔	Herzwurzler		sauer	☾☾	-	SG		
<i>Lonicera caprifolium</i> – Gartengeißblatt	Mitteleuropa	V-VI	Schlinger	ja	3 - 5 m ↑	1 - 3 m ↔	Herzwurzler		neutral	☾☾	+++	SG		
<i>Rosa arvensis</i> – Feld-Rose	einheimisch	VI-VII	Spreitzklimmer	ja	0,5 - 1m ↑	1 - 2 m ↔	Tiefwurzler		sauer	☾	+++	SG		
<i>Rosa</i> – Kletterrose Rambler und Climber	Kreuzung Asien	VI-VIII	Spreitzklimmer	ja	~3 - 5 m ↑	~3 - 5 m ↔	Tiefwurzler		säuerlich	☾	+++	SG		
<i>Jasminum nudiflorum</i> – Winterjasmin	Asien	II-III	Spreitzklimmer	ja	2 - 3 m ↑	2 - 3 m ↔	Flachwurzler		säuerlich	☾☾	++	SG	/	
<i>Lathyrus latifolius</i> – Breitblättrige Platterbse	Südeuropa	VI-VIII	Ranker	ja	1 - 2 m ↑	1 - 2 m ↔	Flachwurzler		sauer	☾	+++	SG		
<i>Periploca graeca</i> – Griechische Baumschlinge	Mittelmeerraum	VII-VIII	Schlinger	ja	5 - 10 m ↑	1 - 3 m ↔	?		neutral	☾☾☾	-/+	SG		
<i>Vitis vinifera</i> – Weinrebe	Mittelmeerraum	VI-VIII	Sprossranker	ja	8 - 10 m ↑	6 - 8 m ↔	Tiefwurzler		neutral	☾	+++	SG		